

INDIKACE DENZITOMETRIE dle SMOS a ISCD

A. Ženy nad 65 let muži nad 70 let

B. Ženy od 40 let věku a muži od 55 let věku, kteří prodělali nízkotraumatickou zlomeninu (tj. podklouznutí, pád při chůzi, bez anamnézy traumatu atd).

C. Pacienti léčení kortikoidy (kromě inhalační aplikace) užívané 3 a více měsíců v dávce ekvivalentní 2,5 mg prednisonu denně.

D. Ženy mladší 65 let a muži mladší 70 let za předpokladu přítomnosti dalšího rizikového faktoru:

1. Osteoporóza na RTG
2. Snížení výšky o více než 3 cm oproti výšce cca ve 25 letech věku
3. Menopauza
4. Sekundární amenorhea (trvající déle než 1 rok)
5. BMI pod 19 kg/m², resp. hmotnost pod 57 kg
6. Léky, u kterých lze předpokládat pokles kostní denzity (především):
 - 6.1. Kortikoidy
 - 6.2. Antiestrogenní terapie (aromatázy, GhRH analoga)
 - 6.3. Antiandrogeny
 - 6.4. Antiepileptika
 - 6.5. Antikoagulancia (warfarin, LMWH)
 - 6.6. Imunosupresiva
 - 6.7. Dlouhodobá léčba antidepresivy
7. Onemocnění spojená s poklesem kostní denzity
 - 7.1. Malabsorbce a maldigestce syndromy
 - 7.2. Renální osteopatie
 - 7.3. Hypertyreóza
 - 7.4. Primární hyperparatyreóza
 - 7.5. Hypogonadismus
 - 7.6. Cushingův a Addisonův syndrom
 - 7.7. Diabetes mellitus I. typu na inzulínoterapii
 - 7.8. Deficit růstového hormonu
 - 7.9. Stav po transplantaci
 - 7.10. Autoimunitní choroby léčené kortikoidy

Pokud možno pacienta k denzitometrii vybavit kopií posledního RTG nálezu páteře, (event. kyčle).